

632. *Trichoscyphella calyciformis* (Vel. ex Willd.) Nann.

Colonies denses sur rameaux et brindilles desséchés de suffin, col de l'Echelle au-dessus de la chapelle de N. D. de Bonne-Rencontre, 1750 m ; réceptacles reviviscents à l'humidité ; R.R.R. (ou inaperçus par temps sec).

213. *Dasyscypha flavovirens* Bres. (Dét. R. Heim).

Colonies denses sur rameaux morts de mélèze, notamment dans les prés-bois des Eduits de Chantemerle sur des branches assemblées en fagots, 1700-1800 m ; réceptacles reviviscents à l'humidité ; C. (mais inaperçus par temps sec) ; (printemps).

Observ. Espèce décrite et figurée par R. Heim en 1932, dans le Bulletin de la Soc. Myc. de France (T. XLVIII, p. 71 et pl. IX, fig. 6).

436. *Dasyscypha fuscosanguinea* Rehm (Dét. R. Heim).

En colonies sur branche morte de suffin, bois de Villard-Laté, 2043 m ; réceptacles reviviscents à l'humidité ; R.R.R. (ou inaperçus par temps sec) (printemps).

Observ. Espèce étudiée par R. Heim en 1932, dans le Bulletin de la Soc. Myc. de Fr. (T. XLVIII, p. 73).

CIBORIACÉES.

334. *Helotium virgultorum* (Vahl.) Karst. (Dét. R. Heim).

En colonies : sur branches mortes d'aune à la base du bois de Villard-Saint-Pancrace, 1400 m, et dans la sagne de l'Infernet, 1710 m ; sur rameau mort de saule, bassin des sources de la Durance, 2200 m ; R.R.

256. *Helotium salicellum* Fr., ss. Grelet.

Réceptacles cespiteux sur branches mortes d'aune, à la base du bois de Villard-Saint-Pancrace, 1400 m, et dans l'aunaie de Névache, 1700 m ; R.R.

Observ. Espèce voisine de la précédente.

339. *Rutstræmia alni* n. sp. = *Phialea* Boud. (fig. 21).

Réceptacle stipité, cupuliforme, puis déprimé et à bord renversé-ondulé, jusqu'à 9 mm de diam., à marge dentelée-granuleuse, entièrement brun, finement tomenteux extérieurement (à la loupe) ; pédi-cellule de longueur variable, jusqu'à 4 mm, assez épais, un peu aminci à la base, concolore, devenant creux ; chair relativement épaisse (1 mm), brune.

Sp. incolores s.m., ellipsoïdales-subfusoïdes, memb. lisse, proto. granuleux, biguttulé, $20 - 24 \times 8 - 10 \mu$; asques subcylindriques, à sommet tronconique et foramen marginé, octosp., $220 - 240 \times 14 - 16 \mu$ environ; paraphyses simples ou ramifiées à la base, septées un peu renflées vers le sommet; jaunâtre-pâle, 220×4 (sommet) μ par ex.




FIG. 21. — 339, *Rutstroemia alni*.

a, grandeur naturelle ; b, coupe $\times 2$;
c, spores, asques et paraphyses $\times 500$: d, hyménium $\times 100$.

En petits groupes sur les branches mortes d'aune, à la base du bois de Villard-Saint-Pancrace, 1400 m ; R.R.R.

Observ. Cette espèce paraît voisine de *R. rivularis* (Crouan) Le Gal.

BULGARIACÉES.

333. *Coryne uralensis* (Nyl.) Sacc. (Dét. R. Heim).

Réceptacles cespiteux sur souche pourrie d'aune, à la base du bois de Villard-Saint-Pancrace, 1400 m ; R.R.R.

OMBROPHILACÉES.

603. *Calycella acicularum* Roll. (Dét. M. Le Gal).

Rares réceptacles sur aiguilles de mélèze, dans le bois de Chabas, 1440 m ; R.R.R. (ou inaperçu).

626. *Rhizopogon rubescens*, var. *sulfureum*.

A typo solum differt colore ab origine luteo.

Humi, sub pinis uncinatis gregatim, bois des Rousses (Briançonnais), 1990 m ; R.R.R., aestate.

10. *Hymenogaster Remyi* Dod.-Zell.

Fungo primo subterraneo, deinde semiterrestri, tuberiformi, globoso-flexuoso, usque 6 cm lato, albido, luteo-ochraceo maculoso, ad finem concolore ; base sterili minuscula, funiculo adherenti ; cute pelliculari ; carne minima-cavernosa, fusca, inodora, in senectute foetida.

Sporis s.m. flavis-acribus, obovodeis, appendice infera prominenti, rugosis, $8 - 11 \times 6 - 8 \mu$; basidiis, inter pseudoparaphyses, longis-cylindraceis, 1, 2, 3, vel 4 sporis, ad $40 \times 6 \mu$.

In silvis, sub pinis (silvestribus et uncinatis), seorsum, vel 2 - 3 conjunctim, (Briançonnais), 1450-2020 m ; A.R., vel inviso ; vere aestate.

339. *Rutstroemia alni*.

Fungo stipitato, primo cupuliformi, deinde depresso extra incurvato-undato, margine denticulato-granato, usque 9 mm lato, in totum brunneo, facie subtiliter tomentosa ; stipite \pm longo, usque 4 mm, parum crasso et inferne attenuato, concolore, pleno deinde cavo ; carne brunnea, 1 mm.

Sporis s.m. incoloribus, ellipsoideis-subfuscis, levibus, biguttulatis, $20 - 24 \times 8 - 10 \mu$; ascis subcylindratis, apice truncato, foramine marginato, octosporis, ad $220 - 240 \times 14 - 16 \mu$; paraphysibus filiformibus, septatis, parum superne crassis, subflavis, ad $220 \times 4 \mu$ (superne).

Ad ramulum alni gregatim, base du bois de Villard-Saint-Pancrace (Briançonnais), 1400 m, R.R.R. (sp. *R. rivularis* (Crouan) Le Gal proxima).

411. *Calycella laricis*.

Fungo stipitato, capitulo subgloboso, deinde curvato, usque 2,5 mm lato, in totum albo-hyalino mox subflavo-ochraceo ; stipite curvo, ad $2,5 \times 0,7$ mm, saepe omnino vel base colore intentiore.

Sporis s.m. incoloribus, cylindraceis, levibus, intus ad extremum granosis, $16 - 21 \times 6 - 7 \mu$; ascis anguste clavatis, apice truncato, foramine marginato,